

# imagens da roleta

<p>Peg Tubo de Gastectomia Percutânea: O Que é e Como Cuidar</p>

<p>A Peg ou tubo de gastectomia percutânea é um tubo macio colocado através da pele através do estômago, o que permite que alimentos e líquidos entrem diretamente na barriga.</p>

<p>Este tipo de tubo é utilizado em situações em que as pessoas têm dificuldades em comer ou beber por meios normais, como no tratamento de constipação, em que o medicamento comumente usado é o polietileno glicol.</p>

<p>O polietileno glicol é um medicamento que está na classe de laxantes, o que significa que ele ajuda a movimentar as coisas no

intestino.</p>

<p>Partes da Peg</p>

<p>Alça: serve para fechar o tubo.</p>

<p>Bump: impede a queda do tubo.</p>

<p>Cuidados com a Peg</p>

<p>Existem maneiras adequadas de cuidar da Peg após a cirurgia, a fim de garantir durabilidade e eficácia.</p>

<p>Manter o local da perfuração limpo e seco.</p>

<p>Verifique a presença de flip-flow clamp para fechar o

tubo.</p>

<p>Não force a alimentação se a passagem for difícil ou

u dolorosa, consulte um médico.</p>

<p>Perguntas Comuns</p>

<p>O que é um polietileno glicol?</p>

<p>é um medicamento que age como laxante e possui como função

o principal incentivar o movimento intestinal.</p>

<p>Qual a finalidade da Peg?</p>

<p>Elle permet de faire entrer de la nourriture et des boissons directement

dans l'estomac, facilitant l'alimentation en général pour ceux qui ont du mal à digérer ou à s'alimenter de manière

normale.</p>

<p>Obs: Este artigo é uma tradução livre e resumida das informações inseridas. Recomenda-se, na vida, consultar

um profissional da saúde. O conteúdo aqui exposto não pode ser usado nem utilizado para fins comerciais. O custo de um polietileno glicol

pode variar entre R\$ 30,00 a R\$ 55,00 reais dependendo do local e da quantidade. O valor da instalação da Peg pode variar de R\$ 1 500,00 e R\$ 7 000,00, dependendo das condições e dos hospitais. Leia

também um overdose de laxantes pode ser fatal, especialmente para

>

<p>para as pessoas que estão em uso constante de laxantes afrouxantes e estimulantes. O uso exagerado deste medicamento pode causar d